

Aantal weken	5w HA	9w HA	11-13w Gyn	16w HA	20-22w Gyn	24w HA	28-30w Gyn	34w HA	vanaf 37w Gyn	
Anamnese en info	Diagnose/beleving - zorgplan - actief risico's screenen (informed consent prenatale diagnose)	Beleving/klachten + informed consent prenatale diagnose	Beleving/klachten	Beleving/klachten	Beleving/klachten - kindbewegingen - signalen vroegtijdige ontsluiting en klachten pre-eclampsie	Beleving/klachten - kindbewegingen - signalen vroegtijdige ontsluiting en klachten pre-eclampsie	Beleving/klachten - kindbewegingen - signalen vroegtijdige ontsluiting en klachten pre-eclampsie	Beleving/klachten - kindbewegingen - signalen vroegtijdige ontsluiting en klachten pre-eclampsie	Beleving/klachten - kindbewegingen - klachten pre-eclampsie Info borstvoeding Bespreking bevalling	Beleving/klachten
KO	bloeddruk startgewicht	bloeddruk gewicht	bloeddruk gewicht harttonen	bloeddruk gewicht harttonen fundushoogte	bloeddruk gewicht harttonen fundushoogte	bloeddruk gewicht harttonen fundushoogte	bloeddruk gewicht harttonen fundushoogte	bloeddruk gewicht harttonen fundushoogte	bloeddruk gewicht harttonen fundushoogte ligging	bloeddruk gewicht harttonen fundushoogte ligging
Labo	Hb, Hct, thrombocyten, ferritine (Hb < 11.5), bloedgroep/Rh*, indirecte Coombs, nuchtere gly, toxo IgG+IgM*, rubella IgG*, hiv°, TPHA en TPPA°, HbsAg, anti HCV°, CMV IgG + IgM, varicella?, parvo B19?, dipstick voor proteïnurie	PAPP-A BHCG (aanbod prenatale screening) → Praktisch: Geef labo-uitslag mee met patiënt, zodat gynaecoloog labo kan informeren.		urinecultuur (asymptomatische bacteriurie) dipstick voor proteïnurie		glucose (50 g challenge test) Hb, Hct, indirecte Coombs, CMV, toxo, dipstick voor proteïnurie		dipstick voor proteïnurie	GBS wisser	
TO			echo		echo		echo			
Voedingssuppl	foliumzuur	foliumzuur	foliumzuur							
AntiD-vacc				griepvaccin (voorkeur 2de trimester)		Boostrix	zo nodig Rhogam			