



Gebruiksaanwijzing voor analyse cortisol in speeksel met Salivette

Speekselafname

Tijdstip

De afname vindt bij voorkeur 's avonds tussen 22 u. en middernacht plaats indien de analyse van cortisol in speeksel gewenst is.

De speekselafname kan pas starten 30 minuten na de laatste orale voedings- of geneesmiddeleninname.

Werkwijze

- Open de dop bovenaan de Salivette.
- Haal het wattenrolletje uit de tube.
- Plaats het wattenrolletje in de mond.
- Kauw zacht gedurende 1 à 2 minuten, dit is meestal genoeg om voldoende speeksel te bekomen. Hou bij twijfel het wattenrolletje in de mond tot je het gevoel hebt dat je het verzamelde speeksel niet langer in de mond kan houden.
- Plaats het verzadigde wattenrolletje terug in de tube.
- Sluit de Salivette opnieuw met de dop.
- Bewaar het staal in de koelkast.



Indienen van het staal

Meld je aan met je identiteitskaart aan de inschrijvingskiosk in de inkom van het ziekenhuis voor patiëntenvignetten (kies bloedafname).

Bied je de dag na de staalafname tussen 8 en 9 u. 's morgens aan op het labo op de 6e verdieping (route 627) in het bezit van de Salivette en de aanvraagbrief.

Goede zorg laat niemand achter

Dienst Laboratoriumgeneeskunde

Laboratoriumdirecteur
Dr. Roggeman

Stafleden
Dr. Cauwelier
Dr. H. Devos
Dr. J. Emmerechts
Dr. K. Floré
Dr. M. Langlois
Apr. A. Muyldermans
Dr. M. Reynders
Dr. T. Vanwynsberghe
Prof. Dr. M. Vercammen

050 45 99 00
laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

AZ Sint-Jan Brugge A.V.

Campus Sint-Jan, Ruddershove 10, 8000 Brugge, 050 45 21 11

Campus SFX, Spaanse Loskaai 1, 8000 Brugge, 050 47 04 70

info@azsintjan.be - www.azsintjan.be

v.u.: Hans Rigauts, AZ Sint-Jan Brugge AV,
Ruddershove 10, 8000 Brugge - september 2024

AZ
Sint-Jan
Brugge

AZ
S.J.