

Vaccinaties bij oncologische patiënten (2026)

Praktische aanbevelingen vanuit het Oncologisch Centrum
AZ Sint-Jan Brugge voor huisartsen

Influenza en COVID-19

Jaarlijkse vaccinatie – deze mogen zo gewenst op hetzelfde moment toegediend worden (advies HGR [influenza/ COVID-19](#))

Bij patiënten onder chemotherapie/ADC (Antibody Drug Conjugate): bij voorkeur enkele dagen voor de volgende toediening.

Bij patiënten onder immunotherapie/doelgerichte therapie/hormonale behandeling: geen specifieke dag gerelateerd aan de behandeling.

Daarnaast moeten alle personen die samenwonen met de patiënt gevaccineerd worden tegen influenza voor optimale bescherming. COVID-19: alleen boostervaccins voor huisgenoten bij zeer ernstige immunosuppressie (bv. transplantatiepatiënten).

Pneumokokkenziekte

Vaccinatie om de 5 jaar (advies [HGR](#))

Primaire vaccinatie:

Prevenar 20® (nieuw 20-valent conjugaatvaccin; terugbetaling beperkt tot patiënten van 65 tot 80 jaar met bepaalde comorbiditeiten):

- Bij voorkeur minstens 2 weken voor de start van eender welke oncologische behandeling.
- Bij patiënten onder chemotherapie/ADC: bij voorkeur enkele dagen voor de volgende toediening.
- Bij patiënten onder immunotherapie/doelgerichte therapie/hormonale behandeling: geen specifieke dag gerelateerd aan de behandeling.

Herhalingsvaccinatie met **Pneumovax 23®** om de 5 jaar.

Indien al gevaccineerd met **Prevenar 13®** en **Pneumovax 23®**: herhalingsvaccinatie met **Pneumovax 23®** om de 5 jaar.

Difterie-tetanus-kinkhoest

Vaccinatie met **Boostrix®** 1 keer om de 10 jaar (advies [HGR](#))

Herpes zoster

Nieuw vaccin aanbevolen voor elke oncologische patiënt (advies [HGR](#))

Shingrix®: 2 doses met 4 tot 8 weken tussen elke dosis (maximaal 6 maanden interval tussen beide doses).

- Eerste dosis bij voorkeur minstens 2 weken voor de start van eender welke oncologische behandeling.
- Tweede dosis: schema hieronder te volgen.

- Bij patiënten onder chemotherapie/ADC: bij voorkeur enkele dagen voor de volgende toediening.
- Bij patiënten onder immunotherapie/doelgerichte therapie/hormonale behandeling: geen specifieke dag gerelateerd aan de behandeling.

RSV

Aanbevolen bij oncologische patiënten > 60 jaar (advies HGR) (terugbetaling > 65 jaar (+200€)) 1 dosis **Arexvy®** beschermt minstens 3 seizoenen (Folia 2025)

Bij voorkeur minstens 2 weken voor de start van eender welke oncologische behandeling.

- Bij patiënten onder chemotherapie/ADC: bij voorkeur enkele dagen voor de volgende toediening.
- Bij patiënten onder immunotherapie/doelgerichte therapie/hormonale behandeling: geen specifieke dag gerelateerd aan de behandeling.