

Samenwerkingsdocument opvolging zwangerschap HABO/AZ Sint-Lucas/AZ Sint-Jan/AZ Zeno (versie 11/2021)

# weken	5w HA	9w HA	rond 11-14w GYN	rond 16w HA	rond 20w GYN	rond 24w HA/GYN	29-33w GYN	≥32w HA/GYN om de 2-4w
Anamnese en info	Diagnose/beleving Screenen medische obstetrische / mentale / sociale risicofactoren Info prenatale diagnose/NIPT en informed consent Samenwerkingsdoc. opvolging zw toelichten	Beleving/klachten Screenen medische obstetrische / mentale / sociale risicofactoren Info prenatale diagnose/NIPT en informed consent	Beleving/klachten Screenen medische obstetrische / mentale / sociale risicofactoren Info prenatale diagnose/NIPT en informed consent	Beleving/klachten	Beleving/klachten - kindbewegingen - signalen vroegtijdige ontsluiting en pre-eclampsie Screening mentale toestand (Whooley/GAD2 en EPDS indien nodig)	Beleving/klachten - kindbewegingen - signalen vroegtijdige ontsluiting en pre-eclampsie Evt. herscreening mentale toestand (EPDS)	Beleving/klachten - kindbewegingen - signalen vroegtijdige ontsluiting en pre-eclampsie Info prenatale oefeningen	Beleving/klachten - kindbewegingen - klachten - pre-eclampsie Info borstvoeding Info bevalling/postpartale zorg
KO	Bloeddruk Startgewicht BMI ¹	Bloeddruk Gewicht	Bloeddruk Gewicht Harttonen	Bloeddruk Gewicht Harttonen Fundushoogte	Bloeddruk Gewicht Harttonen Fundushoogte	Bloeddruk Gewicht Harttonen Fundushoogte	Bloeddruk Gewicht Harttonen Fundushoogte	Bloeddruk Gewicht Harttonen Fundushoogte Ligging
Labo	Hb, Hct, thrombocyten, ferritine (Hb <11.5), bloedgroep/Rh, indirecte Coombs, nuchtere glyc ² , toxo IgG+IgM, rubella IgG, hiv, TPHA, HbsAg, anti HCV, CMV IgG+IgM, varicella?, parvo B19? Dipstick proteïnurie	Dipstick proteïnurie	NIPT, vervolledigen bloedname 1ste trim Dipstick proteïnurie	CMV IgG+IgM, bij seroneg pt Urinecultuur (asymptomatische bacteriurie) Dipstick proteïnurie	Dipstick proteïnurie	Glucose: nuchtere glyc ³ <100 en BMI<30 en geen zw DM in VG: 50 g-GCT / nuchter glyc ≥100 en ≤125 EN/OF BMI ≥30 EN/OF zw DM in de VG: 75g-OGTT - bariatrische HK in VG ³ : verwijzing endocrino Hb, Hct, indirecte Coombs, Toxo IgG+IgM bij seroneg pt Dipstick proteïnurie	Dipstick proteïnurie	Dipstick proteïnurie GBS wisser tussen 35 - 37w (gyn)
TO			Echo 1		Echo 2		Echo 3	
Vitamines	Foliumzuur	Foliumzuur	Foliumzuur					
AntiD-vacc	Griepvaccin zo geen basisvaccinatie gebeurd is dien hier een dTpa toe	Griepvaccin	Griepvaccin	Griepvaccin	Griepvaccin	Griepvaccin dTpa	zo nodig Rhogam Griepvaccin	Griepvaccin

¹ <https://www.uzleuven.be/nl/gynaecologie-en-verloskunde/verloskunde/zwangerschap/gezond-zwanger-zijn/gewichtstoename/aanbevolen-toename-op-basis-van-bmi>

² nuchter glycemie ≥ 100 en <125 mg/dl, BMI≥30, zw DM in de VG: doorverwijzing diëtiste; ≥125 mg/dl verwijs naar endocrinoloog

³ nuchtere glycemie geprikt tijdens 1ste trimester bepaalt de aard van de suikertest/ Bariatrische heekunde in de VG: geen suikertest en verwijzing endocrinologie voor een 7-punts glucose dagcurve op 24 w gedurende minstens 3d

HA huisarts
GYN (consultatie) Gynaecologie
HABO huisartsen Brugge-Oostende
KO klinisch onderzoek
TO technisch onderzoek