



DIENST INWENDIGE ZIEKTEN

Afdeling nefrologie, infectieziekten en algemeen inwendige ziekten

Dr. J. Van Praet
Dr. S. Vandecasteele

Secretariaat:
t: 050 45 23 10
f: 050 45 22 99
www.nefrologiebrugge.be

LABORATORIUMGENEESKUNDE

Dr. E. Nulens
Dr. M. Reynders

Secretariaat:
t: 050 45 99 00
f: 050 45 26 19

ZIEKENHUISAPOTHEEK

Apr. V. Grootaert

Secretariaat:
t: 050 45 25 00
f: 050 45 25 09

SOCIALE DIENST

Ewout Laureyns

Secretariaat:
t: 050 45 20 40

OPAT Verwijderen PICC

(Perifeer Ingebrachte Centrale Catheter)

BENODIGDHEDEN

Materiaal	Aantal
Handontsmetting	
Alcoholische ontsmettingsvloeistof (bij voorkeur met 2% chloorhexidine)	1
Steriel afdekkend verband	1
Niet-steriele handschoenen	
Steriel verbandset (met steriel veld)	1

WERKWIJZE

- Informeer en installeer de patiënt. De arm in 90° ten opzichte van het lichaam
- Handhygiëne
- Open de verbandset en leg het steriel veld op een zuiver werkvlak
- Bevochtig de steriele kompressen met alcoholische ontsmettingsvloeistof
- Verwijder het verband door zijdelings uit te rekken
- Maak de StatLock® los van de huid m.b.v. een kompres gedrenkt in alcohol
- Open de fixatiedeurtsjes onderaan (meer grip dan in het midden) en haal de katheter uit de StatLock®
- Verwijder de oude StatLock®
- Handhygiëne
- Trek niet-steriele handschoenen aan
- Neem met de pincet een steriel kompres en ontsmet de insteekplaats, de katheter en de omgeving (volgorde van zuivere naar minder zuivere omgeving). Respecteer de contacttijd van 30 sec, laat drogen aan de lucht.
- Neem de katheter in de niet-dominante hand
- Houd de kompressen in de dominante hand t.h.v. de insteekplaats
- Trek de katheter **zachtjes** uit terwijl je die rond je vingers of hand windt (*)
- Druk na het verwijderen met de kompressen op de insteekplaats
- Vraag eventueel aan de patiënt om het nadrukken over te nemen
- Controleer of de katheter in zijn geheel werd verwijderd
- Verwijder de handschoenen
- Handhygiëne
- Breng een steriel afdekkend verband aan

(*) Wanneer door weerstand t.g.v. venespasmen het verwijderen van de katheter niet vlot verloopt, onderbreek even de procedure en breng gedurende enkele minuten lokaal warme kompressen aan zodat de bloedvaten dilateren. Stel de patiënt gerust.

