

Patiëntenvignet

I. IN TE VULLEN DOOR BEHANDELEND ARTS

Procedure:.....

Datum:.....

Behandelende arts:.....

Sedatieverpleegkundige:.....

Anesthesist:.....

Type sedatie:.....

II. AANDACHTSPUNTEN

- * Allergieën: nee / ja, welke:.....
- * Laatste inname vocht:..... Gewicht:.....
- * Nuchter: ja / nee
- * Tekenen van obstructie: ja / nee
- * Antistolling (OAC – NOAC): ja / nee
- * Informed consent aanwezig: ja / nee
- * Safe surgery checklist/safe procedure checklist aanwezig: ja / nee
- * Contra-indicatie: niet nuchter (uitzondering zo enkel KALINOX) – tekenen van obstructie – gedaald bewustzijn (omcirkel zo nodig).

III. REGISTRATIE PARAMETERS TIJDENS PROCEDURE/IN ONTWAAK

Tijdstip	Uur	Sedatie graad	Pols	BD	Sat	AH	Medicatie
Presedatie parameters							
Start procedure 0'							
10'							
20'							
30'							
40'							
50'							
60'/1h							
10'							
20'							
30'							
40'							
50'							
60'/2h							

Uitvoerder sedatie:

.....

Handtekening

Sedatiegraad:

1. MINIMALE SEDATIE (wakker, georiënteerd, geen tekenen van verminderd bewustzijn).
2. PROCEDURELE SEDATIE (slaperig maar wekbaar, voert bevelen uit op vraag).
3. DIEPE SEDATIE (wekbaar bij fysieke prikkel, ademt spontaan).
4. ANESTHESIE (niet wekbaar op pijnlijke fysieke prikkel, ademhaling dient ondersteund te worden).

(Einde procedure/begin verblijf ontwaak markeren met horizontale lijn).

IV. HERSTELCRITERIA

ALDRETE ontwaakscore

- A. Spieractiviteit
 - 2. Kan alle ledematen spontaan of op commando bewegen
 - 1. Kan 2 ledematen spontaan of op commando bewegen
 - 0. Geen actieve beweging mogelijk
- B. Ademhaling
 - 2. Kan diep zuchten en adequaat ophoesten
 - 1. Ademt moeizaam, is kortademig
 - 0. Apnoe
- C. Circulatie
 - 2. BD < 20% boven of onder preoperatieve waarde
 - 1. Bloeddruk tussen 20% en 50% boven of onder preoperatieve waarde
 - 0. Meer dan 50% afwijkend van preoperatieve waarde
- D. Bewustzijn (disability)
 - 2. Volledig wakker en georiënteerd
 - 1. Alleen wekbaar op aanspreken
 - 0. Niet wekbaar
- E. Zuurstofsaturatie
 - 2. Saturatie > 92% bij kamerlucht
 - 1. Saturatie > 90% met toediening van extra zuurstof
 - 0. Saturatie < 90% met toediening van extra zuurstof

Score 9 of 10/10: ontslag
 Score 7 of 8/10: herevaluatie na 30'
 Score < 7/10: continue monitoring tot patiënt stabiel is

Tijdstip	A. Motoriek .../2	B. Ademhaling .../2	C. Circulatie .. /2	D. Bewustzijn .../2	E. Saturatie .../2	Totaal .../10
0'						
10'						
20'						
30'						
40'						
50'						
60'						

- * Bij KALINOX gebruik= GCS /15 en saturatie%
- * ALDRETE Score bij ontslag: /10
- * Bijkomende voorwaarden voor ontslag:
 - POKIS (0-4j) <4 FRS-R (4-6j) <4 NRS (>6j) <4 CPG (zware verstandelijke beperking) <4
 - geen/milde nausea
 - geen shivering
- * Uur ontslag:

Uitvoerder:

 Handtekening: